



Łask, 12 sierpnia 2024 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W ŁASKU

**Urzędy Miast i Gmin
powiatu łaskiego i zduńskowolskiego**

Nasz znak: PIW.Zdr.5201.9.2.2024

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku przekazuje komunikat dotyczący obowiązku zgłaszania przypadków ronień u bydła, owiec i kóz w związku z prowadzeniem monitoringu brucelozy. Zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców w zwyczajowo przyjęty sposób.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łasku
lek. wet. Sławomir Borkowski

Załącznik:

1. komunikat



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku

ul. M. Konopnickiej 21, 98-100 Łask

tel.: (43) 675-21-08, fax: (43) 675-91-13,

e-mail: piwlask@piw-lask.pl, www.piw-lask.pl

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁASKU

dotyczący obowiązku zgłaszania przypadku poronienia u przeżuwaczy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku przypomina o prawnym obowiązku posiadaczy zwierząt z gatunku bydło, owca, koza **zgłaszania przypadku poronienia** lub też **podejrzenia poronienia** u zwierząt. Obowiązek ten wynika z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Ronienie jest najczęściej występującym i najbardziej charakterystycznym objawem brucelozy. Do ronienia u krów dochodzi najczęściej między 6 a 8 miesiącem ciąży, natomiast u kóz i owiec w 3-4 miesiącu ciąży. Oprócz ronienia, chorobie mogą towarzyszyć takie objawy jak patologiczne wycieki z dróg rodnych, zatrzymanie łożyska, zapalenie wymienia, czy zapalenie jąder u samców.

Bruceloza jest chorobą zakaźną i zaraźliwą, która podlega obowiązkowi zwalczania. Podatne są na nią wszystkie gatunki zwierząt gospodarskich, domowych, dzikich oraz **człowiek**.

Do zakażenia pałeczkami z rodzaju *Brucella* dochodzi najczęściej przez:

- kontakt z chorymi osobnikami,
- spożycie paszy lub ściółki zanieczyszczonej wodami płodowymi, wyciekami z narządów rodnych pochodzących od roniących albo rodzących zakażone młode,
- spożycie błon płodowych lub kontakt z płodem pochodzącym od zakażonych zwierząt,
- rzadziej przez krycie, czy zabiegi unasienniania,
- przez błony śluzowe narządów płciowych, nosa, jamy ustnej, gardła, czy spojówki.

U ludzi najczęściej dochodzi do zakażenia w trakcie udzielania pomocy przy porodzie zwierzętom zakażonym oraz przy wykonywaniu zabiegów profilaktycznych i leczniczych w okresie poporodowym. Istnieje jednak także możliwość zakażenia podczas pobierania próbek krwi oraz poprzez spożycie surowego mleka i jego produktów.

Po otrzymaniu zgłoszenia ronienia Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadza oględziny płodu, pozostałych zwierząt w stadzie oraz pobiera próby do badania w celu wykluczenia czynnika zakaźnego powodującego poronienie. Próby podlegają badaniu mikrobiologicznemu w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Dodatkowo 12 do 20 dni od poronienia, pobierana jest krew do badań od sztuki podejranej o zakażenie.